

Ernesto Alfonso Ojeda García.

Tipo de estudio	Tipo de estudio al que pertenecen	Medidas de asociación o criterios de validez utilizados	Formulas	Sesgos más comunes	Escala en el nivel de evidencia
Pruebas diagnósticas con resultados cuantitativos y dicotómicos	<ul style="list-style-type: none"> • Observacional • Longitudinal • Analítico 	<ul style="list-style-type: none"> • Especificidad • Sensibilidad • Valor Predictivo positivo • Valor predictivo negativo • Cociente de probabilidad positivo • Cociente de probabilidad negativo. 	$E=VN/(VN+FP)$ $S=VP/(VP+FN)$ $VPP=VP/(VP+FP)$ $VPN=VN/(VN+FN)$ $CPP=S/(1-E)$ $CPN=(1-S)/E$	De medición De confusión De selección De información.	-
Estudio de cohorte.	<ul style="list-style-type: none"> • Observacional • Longitudinal • Analítico 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo Relativo • Riesgo atribuible 	$RR=Ie/Io$ $Ie=a/a+b$ $Io=c/c+b$ $RA=Ie-Io$	De medición De confusión De selección De información.	2b
Casos y controles.	<ul style="list-style-type: none"> • Observacional • Longitudinal • Analítico 	<ul style="list-style-type: none"> • Razón de momios 	$OR=axd/bxc$	De prevalencia De medición De confusión De selección De información.	3b