Hubo un estándar de oro en el cual se comparó la prueba del estudio	El Diagnóstico se resuelve a través de la punción y la biopsia pleural para el cultivo microbiológico y el estudio histológico, asegurando el diagnóstico en el 86 %de losensayos Se ha reportado que estos procedimientos, combinados con cultivos del líquido pleural y esputo, proporcionan la confirmación microbiológica del Mycobacterium tuberculosis en el 90% de los casos
Fue la comparación con el estándar de referencia cegada he independiente	Fue cegada
Se describió adecuadamente la población en estudio, así como el tamizare por el que los pacientes paseo lo antes de ser incluidos en el estudio	No, se hizo referencia con respecto a las características individuales de cada paciente
Se incluyeron pacientes con diferentes grados de severidad de la enfermedad y nos solo pacientes con enfermedad avanzada, o clínicamente evidente	El articulo menciona que se realizó a paciente con tuberculosis en base a tres criterios diagnósticos.
Se describió la manera de realizar la prueba diagnóstica con claridad de modo que se pueda reproducir fácilmente	No.
Se expresaron con claridad los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos	Solo se realiza un comparativo breve
Se definió la manera en que se delimitó el nivel de "normalidad"	No, solo se muestran los resultados finales
Se propone la prueba diagnóstica como una prueba adicional o como una prueba sustituto de la utilidad más comúnmente en la práctica clínica	Se propone como una prueba dio mal debido a la gran cantidad de falsos negativo y falsos positivos.
Se informa de las complicaciones o de los efectos adversos potenciales de la prueba	No hace referencia a efectos adversos
Se proporcionó información relacionada al costo monetario de la prueba	No, nunca se indica el costo de la prueba, solo menciona que el test ADA es d ébano costo