

Isaac Alberto Varela Duran 8vo medicina lamar

1. En un estudio de cohortes donde se revisa la relación que tiene la terapia estrogénica en etapa menopáusica, con el cáncer de mama. Se estudiaron a 1432 pacientes con diagnóstico de cáncer de mamá durante tres años de evolución y se sabía que de estas 320 habían sido tratadas con terapia estrogénica. 1000 las que no tuvieron diagnóstico de cáncer de mama y estaban en etapa menopáusica y de esas pacientes el 16% estuvieron bajo tratamiento estrogénico. Calcula el riesgo relativo, desglosando todas las formulas necesarias para este y al mismo tiempo los resultados.

Cohortes	Diagnóstico de cáncer de mama (+)	Diagnóstico de cáncer de mama (-)	Total
Terapia estrogénica (+)	320	160	480
Terapia estrogénica (-)	1112	840	1952
Total	1432	1000	2432

Riesgo relativo:

Incidencia en expuestos	$A/(A+B) =$	$320/(320+160)= 0.66$
Incidencia en NO expuestos	$C/(C+D) =$	$1112/(1112+840)= 0.56$

1.17 → 117

2. Se realiza un estudio donde se comprara la eficacia para realizar el diagnostico de diabetes mellitus tipo 2, en comparación con la prueba de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada, se estudiaron a 1500 pacientes que debutan con la triada clásica y se les toma la hemoglobina resultando positivos 1000. Despues 1200 pacientes que no tienen datos de la triada clasica fueron positivos a la hemoglobina glucosilada 350. Calcular sensibilidad, especificidad, exactitud, VP+, VP- y la prevalencia.

Cohortes	Triada clásica (+)	Triada clásica (-)	Total
Hemoglobina glucosilada (+)	1000	350	1350
Hemoglobina glucosilada (-)	500	850	1350
Total	1500	1200	2700

Sensibilidad $A/A+C=$	$1000/1000+500= 0.66 \rightarrow 66$
Especificidad $D/B+D=$	$850/350+850= 0.70 \rightarrow 70$
Prevalencia $A+C/A+B+C+D=$	$1000+500/1000+350+500+850= 0.55 \rightarrow 55$
Valor predictivo positivo: $A/A+B=$	$1000/1000+350= 0.74 \rightarrow 74$
Valor predictivo negativo: $D/C+D=$	$850/500+850= 0.62 \rightarrow 62$
Exactitud: $VP+VN/VP+VN+FP+FN=$	$1000+500/1000+500+350+850= 0.55 \rightarrow 55$

3. Se realiza un estudio de casos y controles el cual se buscaba la relación que tenía la exposición a cromo con el cáncer de estomago en la zona norte de Coahulia. En el estudio se detectaron a 1650 pacientes de las cuales vivían 850 en la zona noreste y 800 en la zona noroeste, los de la zona noreste tenían la característica de ser una industria minera casi al 100% y estos tenían relación con la contaminación de sus agua por cromo y la zona noroeste su principal industria es la agricultura, de los pacientes se encontró que el 150 pacientes de la zona noreste tuvieron un diagnostico de cáncer de estomago a los cinco años de estar en exposición y los de la zona noroeste solamente fueron 15. Calcular la razón de momios correspondiente y todos sus datos que conlleva llegar a esta formula.

	Expuestos	NO Expuestos
Casos	150	700
Controles	15	785

Razón de momios= $A \times D / C \times B = 117750/10500= 11.21$
Tiene significancia clínica