

1. En un estudio de cohortes donde se revisa la relación que tiene la terapia estrogénica en etapa menopáusica, con el cáncer de mama. Se estudiaron a 1432 pacientes con diagnóstico de cáncer de mamá durante tres años de evolución y se sabía que de estas 320 habían sido tratadas con terapia estrogénica. 1000 las que no tuvieron diagnóstico de cáncer de mama y estaban en etapa menopáusica y de esas pacientes el 16% estuvieron bajo tratamiento estrogénico. Calcula el riesgo relativo, desglosando todas las formulas necesarias para este y al mismo tiempo los resultados.

	Enfermos	Sanos	Total
Expuestos (estrógeno)	320 (a)	160 (b)	480
No expuestos	1112 (c)	840 (d)	1952
Total	1432	1000	2432

$$RR = \frac{a/(a + b)}{c/(c + d)}$$

- **Riesgo Relativo:**  $= 320/(320+160)/1112/(1112+840) = 0.66/.56= 1.17$
- El RR =1 indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento
- El RR >1 indica que existe asociación positiva
- El RR <1 indica que existe asociación negativa

2. Se realiza un estudio donde se compara la eficacia para realizar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en comparación con la prueba de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada, se estudiaron a 1500 pacientes que debutan con la triada clásica y se les toma la hemoglobina resultando positivos 1000. Después 1200 pacientes que no tienen datos de la triada clásica fueron positivos a la hemoglobina glucosilada 350. Calcular sensibilidad, especificidad, exactitud, VP+, VP- y la prevalencia.

	Con Triada	Sin Triada	Total
Hemoglobina glucosilada positivo	1000 (vp)	350 (fp)	1350
Hemoglobina glucosilada negativo	500 (fn)	850 (vn)	1350
Total	1500	1200	2700

- Sensibilidad:  $vp / (vp+fn) = 1000 / (1000+500) = 66.66\%$
- Especificidad:  $vn / (fp+vn) = 850 / (850+350) = 70.83\%$
- VP (+):  $vp / (vp+fp) = 1000 / (1000+350) = 74.04\%$
- VP (-):  $vn / (vn+fn) = 850 / (850+500) = 62.92\%$

3. Se realiza un estudio de casos y controles el cual se buscada la relación que tenía la exposición a cromo con el cáncer de estómago en la zona norte de Coahuila. En el estudio se detectaron a 1650 pacientes de las cuales vivían 850 en la zona noreste y 800 en la zona noroeste, los de la zona noreste tenían la característica de ser una industria minera casi al 100% y estos tenían relación con la contaminación de sus agua por cromo y la zona noroeste su principal industria es la agricultura, de los pacientes se encontró que el 150 pacientes de la zona noreste tuvieron un diagnóstico de cáncer de estómago a los cinco años de estar en exposición y los de la zona noroeste solamente fueron 15. Calcular la razón de momios correspondiente y todos sus datos que conlleva llegar a esta fórmula.

	Noreste	Noroeste	Total
Con Cáncer	150 (a)	15 (b)	165
Sin Cáncer	700 (c)	785 (d)	1485
Total	850	800	1650

- **Razón de Momios:** En estudio de casos y controles, es el cociente entre la oportunidad de la enfermedad del grupo expuesto y la oportunidad de enfermedad del grupo no expuesto.
- **RM:**  $(a/b)/(c/d) = (150/15)/(700/785) = 10/0.89 = 11.2$
- **RM = 11.2:1**