

Villa Lomelí Oscar Ernesto HGO

INCIDENCIA DE FIBRILACION AURICULAR EN PACIENTES EN HEMODIALISIS

	DESAROLLAN ENFERMEDAD (FA)	NO DESAROLLAN ENFERMEDAD (NO FA)	TOTAL	TASAS DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD
EXPUESTOS	20	144	164	INCIDENCIA DE EXPUESTOS (A/A+B) =
NO EXPUESTOS	0	0	0	INCIDENCIA NO EXPUESTOS (C/C+D)

TASA DE INCIDENCIA = número de casos nuevos / N° de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad o evento por el tiempo que cada una de ellas permanece en riesgo (personas riesgo)

La incidencia fue de 12 casos por cada 100 personas en hemodiálisis de desarrollar FA en 7 años

RR = incidencia en la población expuesta (a/a+b) / incidencia de no expuestos (c/c+d)

RR = 8.2%

Riesgo atribuible = (incidencia en el grupo expuesto) – (incidencia en el grupo no expuesto) = 12%

DESARROLLO DE EVENTOS TROBOTICOS EN PACIENTES CON FIBRILACION AUICULAR

	Desarrollan la enfermedad	No desarrollan la enfermedad	total	
Expuestos	5	15	20	A/a+b
No expuestos	13	131	144	c/c+d
			164	

Incidencia = número de casos nuevos/ población total = 25 pacientes de cada 100 pacientes con FA desarrollaran eventos tromboticos

RR = 2.7%

RA= 0.16

RA%= 64%