

Parcial. 1 -Actividad 3 El riesgo relativo, el riesgo atribuible y el % de riesgo atribuible.

La fibrilación auricular (FA) como problema creciente de salud pública en Px con Hemodiálisis.

TABLA TETRATOLOGICA

	A Casos	B No casos	
EXPUESTO	20	144	164
NO EXPUESTOS	26	164	190
	46	308	354

PREVALENCIA → Expuestos: $20/164 \times 100 = 12.19\%$

→ No expuestos: $26/190 \times 100 = 13\%$

RAZÓN DE MOMIOS = RM= $A \times D / C \times B = 20 \times 164 / 26 \times 144 = 3280/3744 = 0.87$

RIESGO RELATIVO: $RR= A (A+B) / C (C+D)$

$RR= 20 (20 + 144) / 26 (26 +164)$

$RR= 20 \times 164 / 26 \times 190$

$RR = 3280 / 4940 =$ RIESGO RELATIVO: $0.66 =66.39\%$

RA = Incidencia en expuestos - incidencia en no expuestos

RA= $46 - 308 =$ RIESGO ATRIBUIBLE: 262

https://www.lamar.edu.mx/campusdigital/Cursos/Cursos.php?Accion=viewAttachment&activity=2505&attachment=3054&Codigo=ARGOS0958_A2