



# “Actividad 3”

Análisis sobre artículo “Incidencia de fibrilación auricular en pacientes con hemodiálisis. Estudio prospectivo a largo plazo”.

17/09/2014

Universidad Guadalajara Lamar

De la Cruz Cisneros Jonathan Javier LME3320

Medicina Basada en Evidencias

Dr. Hugo Francisco Villalobos Anzaldo

**Cálculos de incidencias en cada grupo, el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el porcentaje de riesgo atribuible.**

Tabla:

	FA	No FA	Total
Diálisis	A 26	B 164	190
No Diálisis	C	D	
Total			

**Nota:** La tabla tetragónica no se puede realizar porque faltan datos sobre los pacientes en estudio (incidencia de FA en pacientes con hemodiálisis), para poder sacar las demás variables y mediciones.

**Preguntas:**

1. **¿Se definió la cohorte adecuadamente?**

Sí

2. **¿Fue la evaluación de la exposición al factor adecuada?**

Sí, por los criterios de inclusión que tuvieron

3. **¿Fue la medición de resultados (enfermedad) similar en los expuestos y los no expuestos?**

Los pacientes estudiados eran los expuestos, no se mencionan a los “no expuestos”

4. **¿Fue el seguimiento de todos los pacientes completo?**

Sí, porque pudo detectarse quiénes presentaron FA, de los pacientes que se estudiaron...

5. **¿Qué tan comparables son los grupos expuestos y no expuestos?**

No puedo compararlos, porque a decir verdad, no encontré pacientes “no expuestos”, en el estudio sólo se mencionan pacientes que estaban siendo sometidos a hemodiálisis y por tanto estaban expuestos al factor de riesgo.