

Actividad 3

Dr. Hugo Francisco Villalobos Anzaldo

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

Dania Vanessa Uribe Landeros

8°A || HOSPITAL GENERAL DE

OCCIDENTE

Actividad 3

INCIDENCIA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS. ESTUDIO PROSPECTIVO A LARGO PLAZO

	Con FA	RITMO SINUSAL	TOTAL
Con Tromboembolismo	5	13	18
Sin Tromboembolismo	15	131	146

INCIDENCIA

No. de eventos nuevos/ No. de individuos susceptibles expuestos al inicio

$$18/164 = 0.109$$

RIESGO RELATIVO

$$\frac{a/(a+b)}{c/(c+d)} = \frac{5/(5+13)}{15/(15+131)} = \frac{5/18}{15/146} = \frac{0.27}{0.10} = \underline{\underline{2.7}}$$

RIESGO ATRIBUIBLE Y % DE RIESGO RELATIVO

$$\frac{Ie-Io}{Ie} = \frac{0.27-0.10}{0.27} = \frac{0.17}{0.27} = \underline{\underline{0.62}} (100) = \underline{\underline{62.9\%}}$$

	Con FA	RITMO SINUSAL	TOTAL
muerres	12	63	75
No muerres	8	81	89

INCIDENCIA

No. de eventos nuevos/ No. de individuos susceptibles expuestos al inicio

$$75/164 = \underline{\underline{0.45}}$$

RIESGO RELATIVO

$$\frac{a/(a+b)}{c/(c+d)} = \frac{12/(12+63)}{8/(8+81)} = \frac{5/75}{8/89} = \frac{0.06}{0.08} = \underline{\underline{0.75}}$$

RIESGO ATRIBUIBLE Y % DE RIESGO RELATIVO

$$\frac{Ie-Io}{Ie} = \frac{0.16-0.08}{0.16} = \frac{0.08}{0.16} = \underline{\underline{0.5}} (100) = \underline{\underline{50\%}}$$

Actividad 3