	Mueren(+)	No mueren (-)	
FA (+)	12 VP	8 FP	20
FA(-)	63 FN	81 VN	144
	75	89	164

VPP= VP/VP+FP 12/20= 60%

VPN= VN/VN+FN 81/144= 56.25%

Riesgo relativo= (VP/VP+FP) / (FN/FN+VN) o (A/A+B) / (C/C+D) .6/.4375= 1.37

Riesgo atribuible= Incidencia expuesta (IE) – Incidencia no expuesta (INE) .6 - .4375= .1625

% RA= (RA/IE) x 100 (.1625/.6) x 100= 27.08%

Tabla 8–3. Puntos a evaluar en estudios de riesgo

Estudios de cohortes	
• ¿Se definió la cohorte adecuadamente (punto de entrada en el estudio, comprobación de ausencia de enfermedad)?	No
• ¿Fue la evaluación de la exposición al factor adecuada?	No
• ¿Fue la medición de los resultados (enfermedad) similar en los expuestos y en los no expuestos?	No
• ¿Fue el seguimiento de todos los pacientes completo?	No
• ¿Qué tan comparables son los grupos de expuestos y no expuestos?	No tan comparables.
Estudios de casos y controles	
• ¿Fueron los casos definidos adecuadamente?	
• ¿Fueron los casos incidentes o prevalentes?	
• ¿Fueron los controles seleccionados de la misma población/cohorte que los casos?	
• ¿Fue la medición de la exposición al factor de riesgo similar en los casos y en los controles?	
• ¿Qué tan comparables son los casos y los controles con la excepción de la exposición al factor de riesgo?	
• ¿Fueron los métodos para controlar los sesgos de selección e información adecuados?	