



**HINOJOSA RUIZ JUAN ANTONIO**

**ACTIVIDAD 3**

	Con enf.	Sin enf	Total
Con Fr	17	75	92
Sin Fr	3	69	72
Total	20	144	164

**INCIDENCIA:**

$$20/164 = 112.2\%$$

**RIESGO RELATIVO:**

$$(A/A+B)/(C/C+D)=$$

$$(17/17+75)/ (3/3+69)= 19.25\%$$

**RIESGO ATRIBUIBLE:**

INCIDENCIA EN EXPUESTOS – INCIDENCIA EN NO EXPUESTOS = 20

**% DE RIESGO ATRIBUIBLE**

$$[(A/A+B)- (C/C+D)] / A/A+B = 77.7\%$$

**SE DEFINIO LA COHORTE ADECUADAMENTE?**

Si del universo de 164 pacientes 20 tenían FA y 144 mantenían ritmo sinusal y

Ambos grupos se estudiaron por 7 años.

**FUE LA EVALUACION DE LA EXPOSICION AL FACTRO ADECUDA?**

Si debido a que los pacientes presentaban de manera relativa los mismos factores de riesgo para la enfermedad

**FUE LA MEDICION DE LOS RESULTADOS SIMILAR EN EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS?**

No

**FUE EL SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PACIENTES COMPLETO?**

Si, se siguieron en un periodo prolongado de tiempo o hasta la muerte de los pacientes o si los

Derivaban a un tratamiento diferente

**QUE TAN COMPARABLE SON LOS GRUPOS DE EXPUESTOS Y DE NO EXPUESTOS?**

Ambos grupos se encontraban con factores de riesgo si hubiera un grupo control de pacientes

Sanos habría sido más sencillo compararlos.

**FUERON LOS CASOS DEFINIDOS ADECUADAMENTE?**

Si se tomaron criterios diagnósticos para determinar FA

**FUERON LOS CASOS INCIDENTES O PREVALENTES?**

Fueron incidentes

**FUERON LOS CASOS SELECCIONADOS DE LA MISMA POBLACIÓN?**

Si se tomaron a pacientes todos con hemodiálisis

**FUE LA MEDICION DE LA EXPOSICION AL FACTOR DE RIESGO SIMILAR E LOS CASOS Y EN LOS CONTROLES?**

NO

**QUE TAN COMPARABLE SON LOS CASOS Y LOS CONTROLES CON LA EXCEPCION DE LA EXPOSICION AL FACTOR DE RIESGO?**

En si todos los sujetos estudiados eran predisponentes a padecer la FA

**FUERON LOS METODOS PARA CONTROLAR LOS SEGGOS DE SELECCIÓN E INFORMACION ADECUADOS?**

SE NECESITO UN GRUPO DE PACIENTES SANOS