



**ACTIVIDAD 3 "ACTIVIDAD 3 "ACTIVIDAD 1.3""  
MBE**

Orozco Ramírez Jaime

LME4186

Hospital civil FAA

8° semestre

15 de septiembre del 2016

## Incidencia de la fibrilación auricular en los pacientes en hemodiálisis. Estudio prospectivo a largo plazo

	T+	T-	Total
FA	5 (a)	15 (b)	20 (n1)
RS	13 (c)	131 (d)	144 (n0)
Total	13	131	164

Sensibilidad:  $a/a+c = .28 \times 100 = 28\%$

Especificidad:  $d/b+d = .90 \times 100 = 90\%$

Exactitud:  $a+d/a+b+c+d = 83 \times 100 = 83\%$

Valor predictivo + :  $a/a+b = .25 \times 100 = 25\%$

Valor Predictivo - :  $d/c+d = 93 \times 100 = 93\%$

Prevalencia:  $a+c/a+b+c+d = 11 \times 100 = 11\%$

Incidencias:

- FA= 15/100
- RS= 3/100

$RR = (5/20) / (13/144) = .25 / .09 = 2.77$

Riesgo atribuible

$$I_e - I_{ne} = (5/20) - (13/144) = .2500 - .0903 = .1597$$

Porcentaje de riesgo atribuible

$$(I_e - I_{ne}) \times 100 = .1597 \times 100 = 16\%$$