



# Medicina Basada en Evidencias

Hernández Magaña María Jackeline

LME4253

En este estudio se tomó una muestra de 190 pacientes que estaban en tratamiento con hemodiálisis mayor a 3 meses, de estos 190 pacientes 26 ya presentaban FA por lo que solo el seguimiento se realizó solo con 164 pacientes durante 7 años

El factor de exposición si fue bueno y bien pensado

Si, aunque en este estudio lo único que querían identificar era la incidencia de la FA y todos los pacientes de la muestra estaban expuestos, los únicos no expuestos que hubo durante la trayectoria fueron los que cambiaron de hemodiálisis a diálisis peritoneal

El seguimiento fue completo ya que tenían los datos de cada uno y las enfermedades de base presentes

NO son comparables

## Estudio de cohortes – Incidencia acumulada

Factor de riesgo o protección	Enf	Nenf	
Expuestos	A	B	A+B
No expuestos	C	D	C+D
	A+C	B+D	A+B+C+D

Factor de riesgo o protección	Enf	Nenf	
Expuestos	20	103	123
No expuestos	0	41	41
	20	144	164

Incidencia:  $(A+C)/(A+B+C+D) = 20/164 = 0.12 = 12\%$

RR:  $(A/A+B)/(C/C+D) = 20/123 / 0/41 = 0.16 = 16\%$

RA:  $(A/A+B)-(C/C+D) = 20/123 - 0/41 = .16 = 16\%$