



INCIDENCIA DE LA FA EN LOS PACIENTES CON HEMODIALISIS.

ACTIVIDAD 3

ALVAREZ CASILLAS ISELA.

	Tromboembolia (+)	Tromboembolia (-)	Total
FA (+)	5 (a)	15 (b)	20
FA (-)	13 (c)	131 (d)	144
Total	18	146	164

IE= (Incidencia de expuestos a la enfermedad).

$$20/164 = \mathbf{.1219}.$$

IO= (Incidencia de los no expuestos).

$$146/164 = \mathbf{.8902}$$

Riesgo atribuible: RA= IE-IO= .1219-.8902= **-.7683**.

% de riesgo atribuible= (IE-IO/IE)*100=**0.04**

$$(.1219-.8902 / (.1219)) * 100 = -.7683 / .1219 = -6.30 * 100 = \mathbf{-630\%}$$

Estudios de cohorte

¿Se definió la cohorte adecuadamente (punto de entrada en el estudio, comprobación de ausencia de enfermedad)?

Si. Porque se estableció la prevalencia de la FA en la población en tratamiento con hemodiálisis mediante un estudio transversal. De los 190 pacientes incluidos, 26 presentaron fibrilación auricular, y la evolución de este grupo ha sido objeto de análisis previos. Los 164 pacientes que se encontraban en ritmo sinusal han sido seguidos durante 7 años, estableciéndose la incidencia de nuevos casos de fibrilación auricular.

¿Fue la evaluación de la exposición al factor adecuado?

No.

¿Fue la medición de los resultados (enfermedad) similar en los expuestos y no expuestos?

No porque los 20 pacientes desarrollaron fibrilación auricular y de estos cinco pacientes tuvieron episodios tromboembólicos. 144 pacientes se mantuvieron en ritmo sinusal y 13 de estos presentó eventos tromboembólicos.

¿Fue el seguimiento de todos los pacientes completo?

Si todos los pacientes fueron seguidos hasta su muerte, la salida de diálisis por trasplante o cambio de técnica o hasta el primero de diciembre del 2004.

¿Que tan comparables son los grupos expuestos y no expuestos?

Todos estaban en hemodiálisis.