




SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO



Hospital General de Zapopan

CRUZ VERDE: Dr. Jorge Humberto Santoscoy

Alumna: María Fernanda Arceo López

Matrícula: LME4332

Fecha: 10/02/17



TABLA DE INCIDENCIA

	EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS	SIN EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS	TOTAL
Px CON FA	6 (a)	14 (b)	20 (a+b)
Px SIN FA	3 (c)	141 (d)	144 (c+d)
			164

INCIDENCIA

Incidencia px expuestos: $a / (a + b) * 100$: **30%**

Incidencia px no expuestos: $c / (c + d) * 100$: **2%**

RIESGO RELATIVO

RR: $(a / a+b) / (c / c+d)$: **14.4**

RIESGO ATRIBUIBLE

RA= $(a / a+b) - (c / c+d)$: **0.27**

PORCENTAJE RA

(RA / Incidencia del grupo con FA): $(0.27 / 0.3) * 100$: $0.9 * 100$: **90%**

PREGUNTAS ESTUDIOS DE COHORTE

1. ¿Se definió la cohorte adecuadamente (punto de entrada en el estudio, comprobación de ausencia de enfermedad)? Si.
2. ¿Fue la evaluación de la exposición al factor adecuada? Si.
3. ¿Fue la medición de los resultados (enfermedad) similar en los expuestos y en los no expuestos? Si.
4. ¿Fue el seguimiento de todos los pacientes completo? Si.
5. ¿Qué tan comparables son los grupos de expuestos y no expuestos? Es difícil la comparación debido a que hay diferencia en el tamaño de los grupos.

PREGUNTAS ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES

1. ¿Fueron los casos definidos adecuadamente? Si.
2. ¿Fueron los casos incidentes o prevalentes? Si.
3. ¿Fueron los controles seleccionados de la misma población/cohorte que los casos? Si.
4. ¿Fue la medición de la exposición al factor de riesgo similar en los casos y controles? Si.
5. ¿Qué tan comparables son los casos y los controles con la excepción de la exposición al factor de riesgo? Son muy comparables ya que se pidió como riguroso control el que se contara con la presencia de la hemodiálisis como tratamiento y se excluían al final quienes cambiaban de tratamiento o que tuviera un deceso.
6. ¿Fueron los métodos para controlar los sesgos de selección e información adecuados? Se dio el seguimiento adecuado a los pacientes y sus tratamientos.

PREGUNTA PICO

Hospital General de Zapopan

Detección temprana de ansiedad/depresión en mujeres del Albergue Sawabona.

P.- Mujeres en situación de peligro.

I.- Detección de ansiedad/depresión mediante la Escala de depresión de Hamilton.

C.- Placebo.

O.- Detectar mujeres en situación de peligro que presenten ansiedad/depresión.