

INCIDENCIA DE LA FA EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS. ESTUDIO PROSPECTIVO A LARGO PLAZO

Mediante un corte transversal, se estableció la prevalencia de FA en una población en tratamiento con hemodiálisis. Se dio seguimiento a 164 pacientes que se encontraban en ritmo sinusal durante 7 años, estableciéndose la incidencia de nuevos casos de FA.

Se determinó la influencia en la mortalidad y en la aparición de fenómenos tromboembólicos en los pacientes que presentaron FA con los que permanecieron en ritmo sinusal.

Resultados:

-En total 144 pacientes permanecieron en ritmo sinusal sin presentar FA, de los cuales, 38 pacientes fueron trasplantados, 3 transferidos a diálisis peritoneal y 75 murieron.

-20 de los 164 pacientes (12.2%) presentaron FA durante 7 años de seguimiento de los cuales 12 (60%) murieron al final de seguimiento.

-No se identificó ningún factor predictor independiente de mayor probabilidad de desarrollar FA

	ENFERMOS	SANOS	
EXPUESTOS	8	28	=36
NO EXPUESTOS	12	116	=128
	=20	=144	=164

IE	$(A/A+B) 8/8+28= 22.2\%$
INE	$(C/C+D) 12/12+116= 9.3\%$
RR	$(IE/INE)= 22.2/9.3= 2.3\%$
RA	$(IE-INE)= 22.2-9.3= 12.9\%$
%RA	$(IE-INE/IE)= 22.2-9.3/22.2= 58.1\%$