



17 DE FEBRERO DE 2017

INCIDENCIA DE FA EN PACIENTES CON HEMODIALISIS

LAMAR

Medicina Basada en Evidencia

Andrea Fernanda Solano de la Torre

8º semestre

Matricula: LME4735

ACTIVIDAD 3

	FENOMENO TROMBOEMBOLICO +	FENÓMENO TROMBOEMBOLICO --	TOTAL
FA +	5	15	20
FA-	13	131	144
TOTAL			164

$$IE: a/a+b \quad 5/(5+15)= 0.25 \rightarrow 25\%$$

$$IO: c/c+d \quad 13/(13+131)= 0.090 \rightarrow 9\%$$

$$RM:ad/cd \quad (5*131)/(13*15)= 3.35$$

$$RA= IE-IO= 25-12= 13$$

$$RA= (IE-IO)/IE= 13/25= 0.25 \rightarrow 25\%$$

En el artículo se aborda y se explica cuál fue el método que se utilizó.

El estudio de cohorte fue bien definido, se realizó el seguimiento por 7 años, la exposición de riesgo es similar entre ambos grupos. En el cual se buscó a pacientes con ritmo sinusal y fueron viendo el número de pacientes que comenzaba con fibrilación auricular, y documentaron esto.

Se realiza una comparación continua de ambos grupos de estudio, y en el artículo se colocaron graficas que comparan el proceso de ambos grupos por los siete años de vigilancia de los estudios.

Los grupos se pueden comparar fácilmente porque tiene puntos en común como la hemodiálisis y que se empezaron a estudiar desde el inicio del estudio.

Bibliografía

CLASE

Vazquez E. y colaboradores. Incidencia de fibrilación auricular en los pacientes en hemodiálisis. Estudio prospectivo a largo plazo Rev Esp Cardiol. 2006;59(8):779-84