



MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

ACTIVIDAD 4:

"ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN RIESGO: COHORTE Y CASOS Y CONTROLES. "

Preciado López Alejandra

Septiembre/2014

ESTUDIO DE LA ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UNA MUESTRA DE 300 PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR

TABLA TETRAGORICA

	Casos	A	B	No Casos	
EXPUESTOS	300			700	1000
NO EXPUESTOS	50	C	D	300	350
	350			1000	

RAZÓN DE MOMIOS

- $RM = A \times D / C \times B =$
 $300 \times 300 / 50 \times 700 = 90000 / 35000 = 2.57$
- Los pacientes con cardiopatía isquémica y edad entre 64 a 75 años tienen 2.57 veces más riesgo de padecer fibrilación auricular.

ANÁLISIS

Este estudio me pareció que estuvo muy bien realizado debido a que especifica muy bien el grupo de edad y las personas que cumplían los criterios, mas sin embargo los pacientes acudieron a consulta general donde posteriormente se les realizo un seguimiento de su caso y se observó cuales desarrollaron fibrilación auricular. Además de que se analizaron si tenían comorbilidades como hipertensión arterial o diabetes mellitus pero sobretodo que estuvieron todos en un rango de edad.

Los sesgos se evitaron eliminando pacientes con complicaciones durante el transcurso de este estudio o que no presentaban los estudios completos o adecuados.