



MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

ACTIVIDAD # 4

RAZON DE MOMIOS

**ESTUDIO DE LA ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS EN UNA MUESTRA DE 300 PACIENTES
CON FIBRILACION AURICULAR**

TORRES BAUTISTA MAURA ITZEL

ANALISIS DEL ESTUDIO

Se definió adecuadamente los casos: SI

Si estos fueron incidentes o prevalentes: PREVALENTES

Si los controles fueron seleccionados de la misma población/cohorte que los casos: SI

Si la medición de la exposición al factor de riesgo fue similar en los casos que en los controles: SI

Que tan comparables son los casos y los controles con la exposición al factor de riesgo: SON MUY COMPARABLES YA QUE SE TOMARON LOS MISMOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SELECCIÓN DE CADA GRUPO

Fueron los métodos para controlar los sesgos de selección e información adecuados: SI

RAZON DE MOMIOS

	ENFERMOS	NO ENFERMOS
EXPUESTOS	300	700
NO EXPUESTOS	50	300
TOTAL	350	1000

$$(a*d)/(b*c) = (300 \times 300) / (50 \times 700) = 90000 / 35000 = 2.5$$