¿Se definió adecuadamente los casos?

Si, se definieron adecuadamente los casos ya que nos muestra un porcentaje de cada factor de riesgo en las muestras casos y controles.

¿fueron incidentes o prevalentes?

Prevalentes, ya que según las tablas presentadas en este articulo el grupo de prevalencia es menor y la incidencia en el grupo de control no es tan alta.

¿Los controles fueron seleccionadas de la misma población que los casos? Si, ya que el articulo menciona que todos los integrantes de la muestra fueron sometidos a las mismas pruebas de inclusión.

¿La exposición al factor de riesgo fue similar en los casos que en los controles? Si, ya que en este articulo se presentan diversos factores de riesgo nosotros concluimos que en algunos la exposición fue similar y en otros fue distinta.

¿son comparables los casos y los controles con la exposición al factor de riesgo? Como se menciona en la pregunta anterior con algunos fue comparable y con otros no.

¿Los métodos para controlar los sesgos de selección e información fueron adecuados? SI, ya que se realizaron los estudios completos para que la inclusión y exclusión de pacientes fuera similar.

Razón de momios:

| НТА | Enfermos | No enfermos | |
|-------------|----------|-------------|------|
| FR PRESENTE | 150 | 252 | 402 |
| FR AUSENTE | 150 | 448 | 598 |
| | 300 | 700 | 1000 |

OR=
$$(a/b)/(c/d) = (150/252)/(150/448) = 1.77$$

| HVI | Enfermos | No enfermos | |
|-------------|----------|-------------|------|
| FR PRESENTE | 78 | 77 | 155 |
| FR AUSENTE | 222 | 623 | 845 |
| | 300 | 700 | 1000 |

$$OR= (a/b)/ (c/d) = (78/77)/ (222/623) = 2.84$$

| DM | Enfermos | No enfermos | |
|-------------|----------|-------------|-----|
| FR PRESENTE | 48 | 77 | 125 |

| FR AUSENTE | 252 | 623 | 875 |
|------------|-----|-----|------|
| | 300 | 700 | 1000 |

OR= (a/b)/ (c/d) = = (48/77)/ (252/623)= 1.54

| TABACO | Enfermos | No enfermos | |
|-------------|----------|-------------|------|
| FR PRESENTE | 63 | 266 | 329 |
| FR AUSENTE | 237 | 434 | 671 |
| | 300 | 700 | 1000 |

OR= (a/b)/ (c/d) =) = (63/266)/ (237/434) = 0.433

| COLESTEROL | Enfermos | No enfermos | |
|-------------|----------|-------------|------|
| FR PRESENTE | 57 | 147 | 204 |
| FR AUSENTE | 243 | 553 | 796 |
| | 300 | 700 | 1000 |

OR= (a/b)/ (c/d) =) = (57/147)/ (243/553) = .882

| ALCOHOL | Enfermos | No enfermos | |
|-------------|----------|-------------|------|
| FR PRESENTE | 66 | 84 | 150 |
| FR AUSENTE | 234 | 616 | 850 |
| | 300 | 700 | 1000 |

OR= (a/b)/ (c/d) =) = (66/84)/ (234/616) = 2.06