



**MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS**  
**DR. HUGO FRANCISCO VILLALOBOS**  
**ANZALDO**

**ACTIVIDAD 4**

**HECTOR ALONSO TIRADO ORNELAS**  
**LME4048**

1. ¿Se Definió Adecuadamente Los Casos?

Sí, ya que los 300 pacientes que fueron incluidos en los casos se diagnosticaron con FA mediante un ecocardiograma Doppler, esto nos da la pauta de que los pacientes presentaban una verdadera FA.

2. ¿Los Casos Fueron Incidentes O Prevalentes?

Incidentes, ya que el criterio de selección fue que los pacientes acudieran por primera vez a valoración a la consulta de cardiología en enero de 1996 a junio de 1997.

3. ¿Los Controles Fueron Seleccionados De La Misma Población/Cohorte Que Los Casos?

Sí, en ambos casos se tuvo que acudir por primera vez a valoración a la consulta de cardiología.

4. ¿La Medición De La Exposición Al Factor De Riesgo Fue Similar En Los Casos Que En Los Controles?

Si, ya que tanto los casos como los controles que se incluyeron tenían factores de riesgo coronario.

5. ¿Qué Tan Comparables Son Los Casos Y Los Controles Con La Exposición Al Factor De Riesgo?

Muy comparables porque se mencionan los factores de riesgo en ambos grupos, en un mínimo y un máximo, siendo la HTA el más alto con un 50% en el grupo de estudio, el de menos riesgo la diabetes con un 16%, en el grupo de control el tabaco con un 38% y la diabetes con un 8%.

6. ¿Fueron Los Métodos Para Controlar Los Sesgos De Selección E Información Adecuados?

Si, ya que los seleccionados tuvieron ciertos criterios además de la exploración que se les realizo.

	ENFERMOS	SANOS	TOTAL
EXPUESTOS	240	217	457
NO EXPUESTOS	60	483	543
<b>TOTAL</b>	300	700	1000

**RAZÓN DE MOMIOS:  $OR = A \times D / B \times C$**

$$OR = 240 \times 483 / 217 \times 60 = 115,920 / 13,020 = 8.90$$