

ESTUDIO DE LA ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UNA MUESTRA DE 300 PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR.

Se analizó un grupo de 300 pacientes con fibrilación auricular de los cuales el objetivo es ver si comparten alguna enfermedad en común para poder sacar como resultado las posibles causas y factores de riesgo que te llevan a una enfermedad de fibrilación auricular.

En este estudio lo que se logró ver son las principales causas de fibrilación auricular entre los pacientes analizados que fue hipertensiva en el 32%, isquémica crónica en el 20%, valvulopatía mitral en el 13%, miocardiopatía congestiva en el 11%, hipertiroidismo en el 4% e idiopática en el 20%. El 50% presentaron hipertensión arterial, el 29% tabaquismo, el 26% hipertrofia ventricular izquierda, el 20% consumo de alcohol, el 19% hipercolesterolemia y el 16% diabetes.

Lo cual considero que se definieron adecuadamente los casos, y que fueron prevalentes ya que los pacientes ya tenían patologías que desencadenaron la fibrilación auricular. Los casos fueron seleccionados de la misma selección corte.

La medición a la exposición al factor de riesgo fue similar a la de los casos controles aunque con variabilidad de los factores, aunque en el grupo de control se encontró que fue más frecuente la cardiopatía isquémica.

Los métodos que se utilizaron fueron los correctos por que con eso se tuvo una respuesta concisa y se llegó al objetivo de la información que se tenía que obtener