

PAOLA SOLORZANO NAVARRETE

LME3479

Conteste correctamente los siguientes espacios con letra roja:

a) Menciones los tres factores que pueden ocasionar diferencias en los resultados de un ensayo clínico aleatorizado:

1.- Grupos desequilibrados en estudios multicentricos

2.- Distribución diferente con respecto a los factores de selección de la muestra

3.- El tamaño desigual en la toma de muestras

b) Cuando se interpreta al valor de p pueden existir 2 tipos de errores, ¿Como se le llama al error que considera azar a un mayor número de asociaciones reales? Error Alfa

c) ¿Cual estudio es mejor?

De acuerdo al porcentaje de error el primer estudio que se realizo con amantadina vs placebo, ya que el resultado de P fue <0.01

1.-) Se realizo un estudio con amantadina vs placebo para observar la curación de un resfriado común, se encontró que en el grupo con el antiviral el cuadro se redujo de 5 días a 3 y en el grupo con placebo el cuadro clínico duro entre 4 y 6 días de duración. Con una p menor a 0.01.

2.- Se realizo un estudio con antigripal con amoxicilina + acido clavulanico vs amoxicilina en el primer grupo de redujo el cuadro infecciosa de faringoamigdalitis de 7 días a 3 disminuyendo el riesgo de complicaciones como otitis media y en el segundo se redujo el cuadro a 5 días con una p menor a 0.05.

d) ¿Cuál de los dos ejemplos tiene mayor significancia estadística

El primero, ya que el valor de p es menor, por lo tanto la significancia estadística es mayor

e) En el siguiente ejemplo calcule el riesgo relativo, el riesgo absoluto y el NNT

No se puede realizar por falta de valores

Se realizo un estudio a 10 años para comparar la incidencia de mortalidad en el grupo de pacientes pos infarto que usaban ARA2 (LOSARTAN) vs PLACEBO en el primer grupo la mortalidad tuvo una incidencia de 45% y en el segundo de 60%

1.- RRR

2.- RRA

3.- NNT

f) De acuerdo al ejemplo hipotético anterior usaría usted losartan en sus pacientes pos infartados y ¿por qué?

No se puede realizar por falta de valores