

## Actividad Preliminar 2

Conteste correctamente los siguientes espacios con letra roja:

a) Menciones los tres factores que pueden ocasionar diferencias en los resultados de un ensayo clínico aleatorizado:

1.- La distribución de ciertas características puede quedar desbalanceada y generar resultados erróneos.

2.- Si los pacientes elegidos tienen más características desfavorables, los resultados pueden enmascarse.

3.- Que la distribución de diferencias entre los pacientes elegidos, no sea equitativa.

b) Cuando se interpreta al valor de p pueden existir 2 tipos de errores, ¿Cómo se le llama al error que considera azar a un mayor número de asociaciones reales?

---

c) ¿Cuál estudio es mejor? \_\_\_\_\_

1.-) Se realizó un estudio con amantadina vs placebo para observar la curación de un resfriado común, se encontró que en el grupo con el antiviral el cuadro se redujo de 5 días a 3 y en el grupo con placebo el cuadro clínico duro entre 4 y 6 días de duración. Con una p menor a 0.01.

2.- Se realizó un estudio con antigripal con amoxicilina + ácido clavulánico vs amoxicilina en el primer grupo se redujo el cuadro infeccioso de faringoamigdalitis de 7 días a 3 disminuyendo el riesgo de complicaciones como otitis media y en el segundo se redujo el cuadro a 5 días con una p menor a 0.05.

d) ¿Cuál de los dos ejemplos tiene mayor significancia estadística? \_\_\_\_\_

e) En el siguiente ejemplo calcule el riesgo relativo, el riesgo absoluto y el NNT Se realizó un estudio a 10 años para comparar la incidencia de mortalidad en el grupo de pacientes pos infarto que usaban ARA2 (LOSARTAN) vs PLACEBO en el primer grupo la mortalidad tuvo una incidencia de 45% y en el segundo de 60%

1.- **RRR** = riesgo en el grupo de control – riesgo en grupo experimental

---

Riesgo en el grupo control

$$RR = 45\% - 60\% / (45) = -.033$$

2.- **RRA** = riesgo en el grupo experimenta – riesgo en grupo control

---

Riesgo en el grupo experimenta

$$RA = 60 - 45 / 45 = 0.25$$

3.- **NNT** NO SÉ CÓMO SACARLO

f) De acuerdo al ejemplo hipotético anterior usaría usted losartan en sus pacientes  
pos                      infartados                      y                      ¿por                      qué?

---

\_\_\_\_\_.