

Medicina Basada en Evidencia

Alumno: Shakib Eduardo Hamden Rivera

Profesora: Dra. Gabriela Robles Gómez

PMIP, 8vo Semestre



Conteste correctamente los siguientes espacios con letra roja:

a) Menciones los tres factores que pueden ocasionar diferencias en los resultados de un ensayo clínico aleatorizado:

1.-Numero necesario a tratar

2.-Reducción Absoluta de riesgo

3.-Riesgo Relativo

b) Cuando se interpreta al valor de p pueden existir 2 tipos de errores, ¿Cómo se le llama al error que considera azar a un mayor número de asociaciones reales?

Error Tipo 2

c) ¿Cual estudio es mejor?

Anulada

1.-) Se realizó un estudio con amantadina vs placebo para observar la curación de un resfriado común, se encontró que en el grupo con el antiviral el cuadro se redujo de 5 días a 3 y en el grupo con placebo el cuadro clínico duro entre 4 y 6 días de duración. Con una p menor a 0.01.

2.- Se realizó un estudio con antigripal con amoxicilina + ácido clavulanico vs amoxicilina en el primer grupo de redujo el cuadro infecciosa de faringoamigdalitis de 7 días a 3 disminuyendo el riesgo de complicaciones como otitis media y en el segundo se redujo el cuadro a 5 días con una p menor a 0.05.

d) ¿Cuál de los dos ejemplos tiene mayor significancia estadística?

Amantadina contra placebo

e) En el siguiente ejemplo calcule el riesgo relativo, el riesgo absoluto y el NNT Se realizó un estudio a 10 años para comparar la incidencia de mortalidad en el grupo de pacientes pos infarto que usaban ARA2 (LOSARTAN) vs PLACEBO en el primer grupo la mortalidad tuvo una incidencia de 45% y en el segundo de 60%

	Placebo	Tratamiento
Casos	420 (a0) A	307 (a1) B
No casos	2634 (b0) C	2744 (b1) D
total	3054 (n0)	3051 (n1)

1.- RRR

$$\frac{A}{A+B}$$

$$\frac{C}{C+D}$$

$$\frac{420}{420+307}$$

$$\frac{2634}{2634+2744}$$

$$\frac{420}{727}$$

$$\frac{2634}{5378}$$

$$0.577/0.489$$

$$\text{Riesgo relativo} = 1.179$$

2.- RRA

$$(A_0/n_0) - (a_1/n_1) \quad (420/3054) - (307/3051) \quad (0.137) - (0.100) \quad \text{RRA} = 0.037, 3.7\%$$

3.- NNT

$$1/(\text{RRA})$$

$$1/0.037$$

$$\text{NNT} = 27.02$$

f) De acuerdo al ejemplo hipotético anterior usaría usted losartan en sus pacientes pos infartados y ¿por qué?

Sí lo usaría, porque por cada 6-7 pacientes se evitará una mortalidad.