



TICAGRELOR FRENTE A CLOPIDOGREL EN PACIENTES SINDROME CORONARIO AGUDO

Ensayo clínico aleatorizado

Desarrollo clínico	Fase III
Objeto	Equivalencia terapéutica
Enmascaramiento	Doble - Ciego
Control	Controlados
Aleatorización	Aleatorizados



Expuestos	Ticagrelor (9,333)	Clopidogrel (9,291)
( Im con elevación st )	,25	,25
(Im sin elevación st)	3,93	3,65



#18,624 de Pacientes

Expuestos	Ticagrelor (9,333)	Clopidogrel (9,291)
Muerte a Causa <u>Vascular</u>	864	1014
Muerte a Causa <u>Hemorragia</u>	961	929

- Criterio de valoración combinado de muerte por causa Vascular:  
14.6% - 16.7% **p<.001**
- Criterio de valoración combinado de Hemorragias:  
11.6% - 11.2% **p< .43**
- Criterio de valoración para Disnea :  
**13.8 % - 7.8%**

Un estudio...

- Multicéntrico aleatorizado
  - Doble ciego
- } Realizado en los años comprendidos del 2006 al 2008 con un total de 18,624 pacientes, en 43 países.
- Se demostró que a mayor dosis del Ticagrelor el paciente responde de mejor manera y mucho más rápido, con menos reacciones adversas a nivel del corazón, por consiguiente disminuye las muertes relacionadas por causas vasculares e infartos, sin embargo este último causaba disnea como síntoma a corto plazo así como, pausas ventriculares por lo que muchos de los pacientes decidieron abandonar el medicamento por las consecuencias.

