



## **MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS**

ACTIVIDAD 1 "ACTIVIDAD 1 "ACTIVIDAD 1.2""

Dr. Jorge Sahagún

Ruelas Velasco Diana Sofía

LME4209

13 de Octubre de 2016

**TABLA 2. TRATAMIENTO ALEATORIZADO, OTROS TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES, SEGÚN EL GRUPO DE TRATAMIENTO.**

<b>GRUPO DE TICAGRELOR</b>	<b>GRUPO DE CLOPIDOGREL</b>
9333 pacientes, la mayoría interrumpió el tratamiento debido a que no deseaba seguir, seguido de un efecto adverso	9186 pacientes, la mayoría interrumpió el tratamiento porque no deseaba seguir, seguido de otros motivos y al final por un efecto adverso
El 82.8% se adhirió a su tratamiento	El 82.8% se adhirió a su tratamiento
El 20% recibió de 300-375mg de clopidogrel	El 59.5% recibió 300-375 mg de clopidogrel
Recibieron medicamentos como ácido acetilsalicílico, heparina no fraccionada y de bajo peso molecular, fondaparinux, bivalirudina	Recibieron mismos medicamentos más nitrato orgánico, B bloqueantes, IECA, reductor del colesterol

Los beneficios de ticagrelor con respecto a clopidogrel aparecieron en pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST

En pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST, comparado con el tratamiento con clopidogrel, el tratamiento con ticagrelor redujo significativamente la tasa de muertes por causas vasculares, infarto de miocardio o ictus, sin incrementar la tasa total de hemorragias graves, aunque con un incremento de las hemorragias no relacionadas con la intervención.