

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

OSWALDO LEON SALAZAR

LME 4232

Actividad 1 parcial 2



Ensayos clínicos, estudios de tamizaje y metanálisis.

fórmulas:

1.- RRR = Tasa incidencia expuestos / Tasa de incidencia no expuestos = $0.098/0.117 = 0.08376$ 2.-

2.-RRA = Tasa de incidencia expuestos – Tasa de incidencia no expuestos = $0.098-0.117 = .0019$ 3.-

3.- NNT = $1/RRA = 1/0.0019 = 52.6315$

| | TICAGRELOL | CLOPIDROGEL | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------|
| S/ muerte vascular | 8469 | 8277 | 16746 |
| C/ muerte vascular | 864 | 1014 | 1878 |
| Total | 9333 | 9291 | 18624 |

Bibliografía:

- https://www.lamar.edu.mx/campusdigital/Cursos/Cursos.php?Accion=viewAttachment&activity=2508&attachment=3057&Codigo=ARGOS0958_A2
- Grupo CTO. «Estadística y epidemiología.» En Manual CTO de medicina y cirugía 8ª edición. CTO, s.f.

Resultados:

Con muerte vascular ticagrelor
= 9.8%

Con muerte vascular
clopidogrel= 11.7%

