

# MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

Luisa Alejandra Vázquez Valdez

## Ensayos clínicos, estudios de tamizaje y metanálisis.

### Desgloce de fórmulas:

1.-  $RRR = \text{Tasa incidencia expuestos} / \text{Tasa de incidencia no expuestos} = 0.098/0.117 = 0.08376$  2.-

2.-  $RRA = \text{Tasa de incidencia expuestos} - \text{Tasa de incidencia no expuestos} = 0.098 - 0.117 = .0019$  3.-

3.-  $NNT = 1/RRA = 1/0.0019 = 52.6315$

### Resultados:

Con muerte vascular ticagrelor = 9.8%

Con muerte vascular clopidogrel = 11.7%

	TICAGRELOL	CLOPIDROGEL	TOTAL
S/ muerte vascular	8469	8277	16746
C/ muerte vascular	864	1014	1878
Total	9333	9291	18624

### Bibliografía:

- [https://www.lamar.edu.mx/campusdigital/Cursos/Cursos.php?Accion=verAttachment&activity=2508&attachment=3057&Codigo=ARGOS0958\\_A2](https://www.lamar.edu.mx/campusdigital/Cursos/Cursos.php?Accion=verAttachment&activity=2508&attachment=3057&Codigo=ARGOS0958_A2)
- Grupo CTO. «Estadística y epidemiología.» En Manual CTO de medicina y cirugía 8ª edición. CTO, s.f.