

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

DANIEL ALEJANDRO OLMEDO TINOCO

Ensayos clínicos, estudios de tamizaje y metanálisis.

Desgloce de fórmulas:

1.- $RRR = \text{Tasa incidencia expuestos} / \text{Tasa de incidencia no expuestos} = 0.098/0.117 = 0.08376$ 2.-

2.- $RRA = \text{Tasa de incidencia expuestos} - \text{Tasa de incidencia no expuestos} = 0.098-0.117 = .0019$ 3.-

3.- $NNT = 1/RRA = 1/0.0019 = 52.6315$

Resultados:

Con muerte vascular ticagrelor = 9.8%

Con muerte vascular clopidogrel= 11.7%

	TICAGRELOL	CLOPIDROGEL	TOTAL
S/ muerte vascular	8469	8277	16746
C/ muerte vascular	864	1014	1878
Total	9333	9291	18624

Bibliografía:

- https://www.lamar.edu.mx/campusdigital/Cursos/Cursos.php?Accion=view Attachment&activity=2508&attachment=3057&Codigo=ARGOS0958_A2
- Grupo CTO. «Estadística y epidemiología.» En Manual CTO de medicina y cirugía 8º edición. CTO, s.f.