



Eduardo Ismael Felix Nuño.





Universidad Lamar



Sexualidad humana

Daniel Rojas

09/02/15

1*A

Método.	Características.
<p data-bbox="186 254 300 285">Pastilla.</p> 	<p data-bbox="816 254 1398 464">Para la mujer, Combinación de estrógenos y progestágenos durante 21 días, con 7 de descanso en los que tiene lugar la menstruación. Impide la ovulación. Se ha de empezar a tomar el primer día de la regla. Si hubiera un olvido, se tomará la píldora olvidada en las 12 horas siguientes.</p>
<p data-bbox="186 506 337 537">Diafragma.</p> 	<p data-bbox="816 506 1398 737">Para la mujer. Método de barrera que impide penetrar a los espermatozoides en el útero. Siempre se debe utilizar con una crema específica. Se coloca en el interior de la vagina con la ayuda de dos anillos. Es elevada siempre que se utilice de la forma correcta.</p>
<p data-bbox="186 842 516 873">Preservativo Femenino.</p> 	<p data-bbox="816 842 1398 1108">Para la mujer. Vaina de poliuretano que se ajusta a las paredes de la vagina. Se coloca en el interior de la vagina con la ayuda de dos anillos. Es elevada siempre que se utilice de la forma correcta. Método de barrera que impide penetrar a los espermatozoides en el útero. Puede causar irritación, alergia o hipersensibilidad al material o lubricantes con que están fabricados.</p>
<p data-bbox="186 1157 597 1188">Métodos vaginales (espermicidas)</p> 	<p data-bbox="816 1157 1414 1360">Son métodos químicos que inmovilizan o inactivan a los espermatozoides. Los espermicidas se colocan unos 10 minutos antes de realizar el coito. Se pueden usar junto a otro método de barrera, como el preservativo. Puede producir ciertas reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.</p>

Método	Características
<p data-bbox="183 279 483 300">Preservativo (Condomes)</p> 	<p data-bbox="821 300 1417 447">Para el hombre. Método de barrera que impide penetrar a los espermatozoides en el útero. Disminuye la sensibilidad y la satisfacción sexual. Puede causar irritación, alergia o hipersensibilidad al material o lubricantes con que están fabricados.</p>
<p data-bbox="183 531 329 552">Vasectomía</p> 	<p data-bbox="821 531 1417 762">Para el hombre. Método quirúrgico irreversible que consiste en obstaculizar los canales deferentes para impedir la salida de los espermatozoides. La intervención no resulta eficaz hasta varios meses después. Método eficaz y permanente. No es un método inmediato. No se aconseja en varones muy jóvenes.</p>